中醫中藥學

義守大學　學士後中醫學系
謝明村、林立偉

各論

第一章　解表藥
第二章　清熱藥
第三章　瀉下藥
第四章　祛風濕藥
第五章　芳香化濕藥
第六章　利水滲濕藥
第七章　溫裏藥
第八章　理氣藥
第九章　消食藥
第十章　驅蟲藥
第十一章　止血藥
第十二章　活血祛瘀藥
第十三章　化痰止咳平喘藥
第十四章　安神藥
第十五章　平肝息風藥
第十六章　開竅藥
第十七章　補虛藥
第十八章　收澀藥
第十九章　湧吐藥
第二十章　外用藥

第三章 瀉下藥

前言

- 定義
  - 凡能引起腹瀉或滑利大腸、促使排便的藥物稱瀉下藥。
- 功效
  - 瀉下藥能通利大便，排除積滯、水飲及其他有害物質，有的還能使實熱下泄。
    - 適用於**大便秘結**、腸道積滯、**實熱**內結及**水腫停飲**等裏實證。

津液辨證

- 水液停聚證
  - 由于臟腑氣化失常，不能對水液進行正常的輸布與排泄，以致水液停聚體內，從而成爲病理性物質。
    - 包括水、濕、痰、飲四種

- 水腫
  - 由于肺脾腎輸布水液的功能失常，以致水液停聚肌膚而出現的病症，稱爲水腫。臨床分陽水、陰水兩大類。
    - 陽水證
      - 陽水證由**外邪侵襲**，病程短，屬**實證之水腫**。
        - 頭面浮腫或全身水腫。
    - 陰水證
      - 陰水證由**病久體弱**，脾腎陽氣虛衰，屬於**虛證之水腫**。
        - 水腫腰以下爲甚。

- **飲**
  - 由於臟腑功能失調而停聚於體內某些部位的病理性水液。因其停聚與侵襲的部位不同，能引發一類病證。
    - 又因飲與痰、水相關，所謂“積水成飲，飲凝成痰”，故飲又常被稱為“痰飲”或“水飲”。
- **痰飲**
  - 痰和飲，是由水液停積凝聚而形成的病理產物。由痰飲停聚所致的病症，稱爲痰飲證。

- 痰飲證。臨床分爲痰證、飲證兩大類。
  - 痰證
    - 水液停聚凝結，質地稠厚者為痰。痰阻於局部或流泛全身而為病者，是為痰證。
  - 飲證
    - 飲為水液停聚凝結，而質地較痰清稀的病理產物。由飲邪停積於胃腸、心肺、胸脅間、組織間等處所致的病證，即為飲證。

- 作用與適應證的不同，可分為
  - 攻下藥 (++)
  - 潤下藥 (+) 潤滑腸道，作用緩和
  - 峻下逐水藥 (+++)

- 配伍
  - 裏實兼有表邪者，當**先解表而後攻裏**，必要時攻下藥與解表藥同用，表裏雙解，以免表邪陷裏。
  - 裏實而正虛者，應與補益藥同用，攻補兼施，使攻下而不傷正
- 使用注意
  - 瀉下作用峻者，易傷正氣，久病體弱，婦女胎前產後，及月經期應慎用或忌用。
  - 此類藥易傷胃氣，奏效即止，慎勿過劑。

第三章　瀉下藥

第一節　攻下藥

大黃、芒硝、番瀉葉、蘆薈

第二節　潤下藥

火麻仁、郁李仁

第三節　峻下逐水藥

甘遂、大戟、芫花、巴豆、牽牛子、商陸、千金子

第一節 攻下藥

- 本類藥具有較強的瀉下作用，性味大多苦寒（沉降），既能通便，又能瀉火，主要適用於：
  - **實熱積滯**，燥屎堅結，大便秘結者。
    - 常配行氣、清熱藥以加強瀉下清熱作用。
  - **寒積便秘**
    - 配伍溫裏藥。
  - **清熱瀉火**：
    - 外感熱病所致的高熱神昏、譫語發狂
    - 或火熱上炎所致的頭痛、目赤、咽痛、牙齦腫痛、吐血、衄血等症

- 治療多種急腹症
  - 根據“六腑以通為用”、“通則不痛”的原理，以攻下藥主，適當配伍：
    - 清熱解毒、活血化瘀藥物，取得了較好的效果。

大黃《本經》

- 【來源】本品係蓼科植物掌葉大黃 Rheum palmatum L. 、唐古特大黃 Rheum tanguticum Maxim ex Balf. 或藥用大黃 Rheum officinale Baill 的根及根莖。前兩種習稱西大黃，後一種習稱南大黃、雅黃。
- 【別名】錦紋、將軍
- 【性味與歸經】
  - 苦，寒。歸脾、胃、大腸、肝、心經。
  - 走氣分，兼入血分。

大黃

大黃



- 【功效】 <u>瀉下攻積</u>，<u>清熱瀉火</u>，<u>解毒</u>，<u>**活血祛瘀**</u>。用於：
  1. 積滯實證，熱積便秘，高熱不退，譫語發狂。
  2. 實火頭痛、目赤、咽痛、口瘡。
  3. 熱毒瘡瘍、腸癰等。
  4. 血瘀經閉、產後惡露不下。
  5. 跌打損傷、瘀血作痛。
  6. 燒傷燙傷
  7. 濕熱黃疸、急性傳染性肝炎。
  8. 熱瀉、急性腸炎，細菌性痢疾。
  9. 熱性出血(如痔瘡出血)。
  10. 膽管結石。
  11. 水腫。
  12. 淋證

【應用 I】

- **瀉下攻積**
  - 用於腸道積滯，大便秘結。大黃苦寒沉降，有較好的瀉下作用， **治療積滯便秘的要藥**。因其苦寒泄熱，故熱結便秘尤為適宜。
    - 熱結便秘、高熱不退、神昏譫語者，可用本品通腑泄熱
      - 常與芒硝、厚朴、枳實等配伍，以加強攻下作用，即大承氣湯
      - 若裏實熱結而氣血虛者，可與黨參、當歸等益氣養血藥配伍，如黃龍湯。
    - 熱結陰傷者
      - 同與生地、玄參、麥冬等養陰生津藥配伍，如增液承氣湯
    - 冷積便秘
      - 脾陽不足，冷積便秘者，同與黨參、附子、乾薑等益氣溫陽藥配伍，如溫脾湯。

【應用 II】

- **清熱瀉火，解毒**
  - 用於**血熱妄行**之吐血、衄血，及咽痛、牙齦腫痛等症。取其**苦寒沉降**之性，使上炎之火得以下泄
    - 臨床上可與黃連、黃芩等瀉火藥同用，如瀉心湯
  - 用於**熱毒瘡瘍**及燒傷。取其清熱解毒，並藉通便作用，使熱毒下泄。如雙解貴金丸 (大黃 : 白芷 =1:10) 。
  - 治腸癰
    - 以大黃配芒硝、丹皮、桃仁等同用 (大黃牡丹皮湯) 。
  - 外用
    - 外敷癰腫的如意金黃散中即有大黃。
    - 治療燒傷，可單用大黃粉，或配地榆粉用麻油調敷。

【應用III】

- **活血祛瘀**
  - 婦女瘀血經閉，產後惡露不下，癥瘕積聚及跌打損傷等。大黃能活血祛瘀，治療瘀血證的常用藥，無論新瘀、宿瘀，均可應用。
    - 治產婦腹痛，腹中瘀血著臍者
      - 本品配桃仁、蟅蟲，如下瘀血湯
    - 治瘀滯經閉
      - 單用一味大黃，分成四份，分別以童便、醇酒、紅花、當歸等製過研末蜜丸服，即無極丸。
    - 治跌打損傷，瘀血在內，脹滿
      - 以大黃與當歸研末，酒調服。

【應用IV】

- 治黃疸、淋病等濕熱證
  - 大黃苦寒泄降，能清泄濕熱
    - 治黃疸
      - 常配茵陳、梔子，即茵陳蒿湯。
    - 治淋病
      - 常配木通、車前子、梔子等，如八正散。

- 大黃炮製方法不同，功能亦有差異。
  - 生大黃瀉下作用較強。
  - 熟大黃功擅瀉火解毒，清利濕熱，瀉下作用較緩。
  - 酒製大黃善清上焦血分之熱，活血作用較優。
  - 炒炭多用於涼血止血。

- 【使用注意】　**孕婦**忌服；產後及哺乳期、月經期慎用。**老人**虛秘，產婦血枯便秘、**脾虛**痞滿及陰疽不可妄用。生大黃苦寒損胃，少數患者服後有惡心、嘔吐或腹痛等副反應，優質大黃反應較少。長期服用可致肝硬變和電解質紊亂。
  - 《藥性論》："忌冷水，惡乾漆。"
  - 《本經逢原》："腎虛動氣及陰疽色白不起等症，不可妄用。"　婦女懷孕、月經期、哺乳期應慎用或忌用。
  - 凡表證未罷，血虛氣弱，脾胃虛寒，無實熱、積滯、瘀結，以及胎前、產後，均應慎服。

【本草備要】

- 性味：大苦大寒
- 歸經：入足太陰(脾)，手足陽明厥陰(大腸胃心包肝)血分。
- 功能：
  - 其性浮而不沉，其用走而不守，若酒浸亦能引至至高之分。
  - 用以蕩滌腸胃，下燥結而除瘀熱。
  - 行水除痰，蝕膿消腫，能推陳致新。
- 主治：
  - 治傷寒時疾，發熱譫語，溫熱瘴瘧，下痢赤白，腹痛裏急。
  - 黃疸水腫，癥瘕積聚留飲宿食，心腹痞滿，二便不通。
  - 吐血衄血，血閉血枯，損傷積血，一切實熱，血中伏火。
- 禁忌：然傷元氣，而耗陰血，若病在氣分，胃虛血弱人禁用

- 大黃氣味重濁，直降下行，走而不守，有斬關奪門之力，故號將軍
  - 《本經疏證》夫火盛而能著血，則無處不可著矣。故著隧道則為血閉寒熱，著橫絡則為癥瘕積聚，著腸胃則為留飲宿食。大黃通血閉，貫火用於土中，在隧道則隧道通，在橫絡則橫絡通，在腸胃則停滯下。
- 大黃主要作用機理
  - 除實火，去瘀血
- 《本經疏證》
  - 地黃氣薄味厚為陰中之陰，大黃氣味并厚，為陰中之陽，故地黃所主是血虛火盛，大黃所主，是火盛著血。

芒硝《別錄》

- 【來源】
  - 天然硫酸鈉經精製而成的結晶體。
  - 朴硝→芒硝→玄明粉
- 【性味與歸經】
  - 鹹、苦，寒。歸胃、大腸經。
- 【功效】瀉熱通便，潤燥軟堅、清火消腫。瀉下、解毒、消腫藥。　瀉下，軟堅，清熱。用於：
  1. 實熱積滯便泌，腹部脹滿，大便燥結，慢性病引起的便泌，習慣性便泌。
  2. 滲出性胸膜炎。
  3. 小兒急性咽喉炎，口腔黏膜炎，鼻腔黏膜炎，外耳道炎等，皆可用單味芒硝溶液外滴。

朴硝(棱柱長方,半透明光澤,脆易斷碎)



芒硝(細芒針)

【應用 I 】

- **瀉下攻積**
  - 用於實熱積滯，大便燥結。芒硝能瀉熱通便，**潤燥軟堅**。
    - 常與大黃相須為用，以增強瀉下熱結的作用，如大承氣湯、調胃承氣湯。

【應用 II】

- **清熱解毒**
  - 用於咽痛、口瘡、目赤及瘡瘍。本品多外用以清熱。如治療咽痛、口瘡的冰硼散，即以玄明粉與硼砂、硃砂、冰片同用
  - 治療咽喉病的西瓜霜，是以芒硝置西瓜中製成。玄明粉化水，可用以滴眼，洗瘡口。
  - 治乳癰可用芒硝外敷，以消腫塊。

- 【使用注意】 脾胃虛寒及孕婦忌服。
  - 《藥對》："畏麥句薑"。
- 【附注】因加工不同，有朴硝、芒硝、玄明粉之分。
  - **朴硝**含雜質較多，多作外敷用
  - **芒硝**質地較純，同內服
  - **玄明粉**質純淨，且已脫水，便於製成散劑，除內服外，常作口腔病、眼病外用藥。
- 部分地區藥房配方時，芒硝與玄明粉不分，統配芒硝。

【本草備要】

- 性味：辛鹹苦大寒。
- 功能：
  - 辛能潤燥，鹹能軟堅，苦能下泄，大寒能除熱
  - 朴硝酷澀性急，芒硝經煉稍緩。
  - 能蕩滌三焦腸胃實熱，推陳致新。
- 主治：
  - 治陽強之病，傷寒疫痢，積聚結癖，留血停痰，黃疸。
  - 淋閉，瘰癧瘡腫，目赤障翳，通經墮胎。

番瀉葉

- 【來源】
  - 本品為豆科草本狀小灌木植物狹葉番瀉(Cassiaangustifolia Vahl) 和尖葉番瀉(Cassia acutifolia Delile) 的葉。曬乾。生用。
- 【性味歸經】
  - 甘、苦，寒。歸大腸經。
- 【功效】
  - 瀉下導滯。　瀉熱通便，健胃消食。

番瀉葉(卵狀披針,上黃綠下淺,葉基不對稱,質薄脆革質)

番瀉葉(狹葉)(披針形)

【應用Ｉ】

- 瀉下導滯
  - 用於便秘。番瀉葉能瀉下導滯，並能清導實熱，**熱結便秘**尤為適宜。大多單味泡服，<u>小劑量可起緩下作用，大劑量則峻下</u>。
    - 也可配伍枳實、厚朴等同用，以增強瀉下導滯作用。

- 【使用注意】
  - 婦女哺乳期、月經期及孕婦忌用。劑量過大，有噁心、嘔吐、腹痛等副作用。
  - 體質虛弱者、孕婦、月經期、產後哺乳期及痔瘡患者忌用；服量過大易引起惡心、嘔吐、腹痛等副作用。

蘆薈《藥性論》

- 【來源】
  - 為百合科植物庫拉索蘆薈 Aloe vera L. 、好望角蘆薈 Aloe ferox Mill 或斑紋蘆薈 Aloe barbadensis L. var. chinensis Berger 葉中的液汁經濃縮的乾燥品。
- 【性味與歸經】苦，寒。歸肝、大腸經。
- 【功效】　瀉下藥。 瀉下，清肝，殺蟲。用於：
  - 熱結便秘及習慣性便秘。
  - 高血壓或中風病後，頭暈頭痛，煩躁不安，失眠。
  - 蛔蟲腹痛及小兒疳積。

蘆薈(不規則塊狀,新棕褐發綠,新酥鬆脆易破碎熱成液,老角形難碎細,老無光澤有臭氣)

【應用 I】

- 用於習慣性便秘及熱結便秘。蘆薈能瀉下通便、善清肝火
  - 若熱結便秘而見煩躁失眠者
    - 以本品與安神之硃砂同用，即更衣丸。
  - 若大便秘結而肝經實熱，見頭暈頭痛、煩躁易怒、驚癇者
    - 配清肝火的龍膽草、梔子、青黛等同用，如當歸龍薈丸。

【應用 II】

- 用於小兒疳積
  - 本品有驅殺蛔蟲作用。蟲積腹痛、面色萎黃、消瘦的小兒疳積，可與補氣健脾、驅蟲的藥物配伍，如肥兒丸。

- 【使用注意】
  - 脾胃虛寒、食少便溏者及孕婦忌用。

【本草備要】

- 性味：大苦大寒。
- 功能：功專清熱殺蟲，涼肝明目，鎮心除煩。
- 主治：治小兒驚癎，五疳，敷齒䘌　濕癬，吹鼻殺腦疳，除鼻癢。
- 禁忌：小兒脾胃虛寒作瀉者勿服。



第二節　潤下藥

- 【來源】
  - 潤下藥大多為植物種子或種仁，富含油脂，能潤燥滑腸，使大便軟化，易於排出。
- 【使用對象】
  - 適用於年老、體弱、久病、產後所致津枯、陰虛、血虛便秘者。

- 【配伍】應用時須根據不同病情，配伍其他藥物。
  - 便秘由於熱盛津傷者，與清熱養陰藥同用。
  - 便秘由於血虛者，與補血藥同用。
  - 便秘兼氣滯者，與行氣藥同用。
- 具有潤下作用的藥物，尚有
  - 瓜蔞仁、柏子仁、杏仁、桃仁、決明子、蜂蜜、當歸、何首烏等

火麻仁　《本經》

- 【來源】
  - 本品係大麻科植物大麻 *Cannabis sativa* L. 的成熟果實。台灣市場品為去果殼的種仁。
- 【別名】
  - 火麻仁、麻仁、麻子仁。
- 【性味與歸經】
  - 甘，平。歸脾、胃、大腸經。

火麻仁

火麻仁

千金子

黑、白胡椒

- 【功效】滑潤性瀉藥。
  - 種子：甘，平；潤燥滑腸，通淋，活血。
  - 葉：味辛，有毒；解毒，麻醉，利尿。
  - 花：苦、辛，溫，有毒；祛風活血。
- – **潤腸通便**。用於：
  - 習慣性便秘，老人及產後便秘。
  - 兼有滋養補虛作用。
  - 外敷治療未成膿的癰腫。

【應用 I 】

- **潤腸通便**
  - 用於老人、產婦及體弱者由於津枯血少所致的腸燥便秘。取其潤燥滑腸通便之功。可與當歸、熟地、杏仁等養血滋陰潤燥之品同用，如溢血潤腸丸。
  - 本品與大黃、厚朴、白芍等同用　，治療熱邪傷陰或素體火旺，大便秘結及痔瘡便祕、習慣性便秘等，如麻子仁丸。

【使用注意】

- 脾虛便溏者不宜。
  - 《本草經集注》：畏牡蠣、白薇，惡茯苓。
  - 《食性本草》：多食損血脈，滑精氣，痿陽氣，婦人多食發帶疾。　多食損血脈，滑精氣，婦人多食發帶疾。腸滑者尤忌。

【本草備要】

- 性味：甘平滑利。
- 歸經：利脾胃大腸之藥。
- 功能：
  - 緩脾潤燥。
  - 破積血，利小便，通乳催生，又木穀也，亦能治風。
- 主治：治陽明病，胃熱汗多而便難。

郁李仁《本經》

- 【來源】薔薇科植物郁李 *Prunus Japonica* Thunb. 及其他 Prunus spp. 各種的乾燥成熟種子。　　為薔薇科植物歐李 Prunus humilis Bge. 郁李 Prunus japonica Thunb. 或毛櫻桃 Prunus tomentosa Thunb 的乾燥成熟種子。
- 【性味與歸經】
  - 辛、苦，平。歸大腸、小腸經。

郁李仁

郁李仁(卵圓,黃棕,縱脈紋,頂端銳尖,基鈍圓,種皮紅薄,2子葉,內乳白油性)

- 【功效】潤滑性瀉藥。
  - 潤腸通便，利水消腫。潤燥滑腸，下氣利水。用於：

1. 習慣性便秘，老人或產後的腸燥便秘，氣虛便秘。
2. 腳氣水腫，小便不利。

【應用 I 】

- 潤腸通便
  - 用於腸燥便秘。郁李仁質潤多脂，能潤腸通便，功效類似麻仁而較強。
    - 常與其他潤腸藥同用，如五仁丸。
- 利水消腫
  - 用於水腫腹滿、腳氣浮腫。本品能利水消腫。
    - 可與桑白皮、赤小豆、白茅根同用，如郁李仁湯。

【使用注意】孕婦、陰虛液虧慎服，大便不實者忌服。

【本草備要】

- 性味：辛苦而甘。
- 歸經：入脾經氣分。
- 功能：性降，下氣行水，破血潤燥。
- 主治：
  - 治水腫癃急，大腸氣滯，關格不通。
  - 用酒能入膽，治悸，目張不眠。
- 禁忌：然治標之劑，多服滲人津液。

藥材	共同	功效	
		特點	其他
火麻仁	潤下藥	老人、產婦及體弱者由於津枯血少所致的腸燥便秘	【本草備要】破積血，利小便，通乳催生
郁李仁		潤腸通便，利水消腫	【本草備要】水腫癃急，大腸氣滯，關格不通

第三節　峻下逐水藥

- 本類藥均有毒，瀉下作用峻猛(易損傷正氣　)，能引起劇烈腹瀉，使體內滯留的水液從大便排除。
  - 部分藥兼有利尿作用。適用於水腫、胸腹積水，及痰飲喘滿等症。
- 中病即止，不宜久服
  - 使用時要注意維護正氣

甘遂《本經》

- 【來源】本品係大戟科植物甘遂 Euphorbia kansui 的乾燥塊根
  - 本品能瀉十二經水，其勢奔湧直決，使之直從谷道而去。古人謂之：“土味曰甘，徑直曰遂”，故名。
  - 甘遂用根且須連珠體時重者，其性為裏。
- 【性味與歸經】苦、甘，寒；有毒。歸肺、腎、大腸經。

甘遂

甘遂

- 味苦寒，有毒。主治大腹，疝瘕，腹滿，面目浮腫，留飲宿食，破症堅積聚，利水穀道。
  - 土味曰甘，徑直曰遂。甘遂味苦，以其泄土氣而行隧道，故名甘遂。土氣不和，則大腹
    - 隧道不利，則疝瘕。大腹則腹滿，由於土不勝水，外則面目浮腫，內則留飲宿食。甘遂治之，泄土氣也。為疝為瘕則症堅積聚。甘遂破之，行隧道也。水道利則水氣散，穀道利則宿積除，甘遂行水氣而通宿積，故利水穀道。

- 【功效】瀉下，利尿藥。瀉水飲、逐痰濕、破積聚。**瀉水逐飲**，**消腫散結**。通利二便。用於：
  1. 水腫脹滿，大小便不通，腎炎。
  2. 肝硬化腹水。
  3. 水飲結胸，滲出性胸膜炎所致胸水，胸滿氣喘。
  4. 痰涎壅盛，癲狂。
  5. 濕熱腫毒。

【應用 I】

- **濕水逐飲**
  - 用於身面浮腫、大腹水腫及胸脇積液等證
  - 甘遂瀉水之力頗峻，服後可致連續瀉下，使滯留之水飲排出體外。
    - 可單味應用，一般與其他逐水藥同用，如二氣湯，治水腫腹滿，即以本品與牽牛子同用。
    - 十棗湯治胸腹積水，以本品與大戟、芫花同用，並用補脾胃之大棗煎湯送服以減少反應。
    - 若治水飲與熱邪結聚所致的水飲結胸，可與大黃、芒硝同用，如大陷胸湯。
    - 治療重型腸梗阻、腸腔積液較多者
      - 以甘遂與大黃、厚朴、桃仁等同用，如甘遂通結湯。

【應用 II】

- **瀉水逐飲**
  - 用於風痰癲癇
    - 取其驅逐痰涎之功。如《濟生方》遂心丹，用甘遂末入豬心內煨過，與辰砂末丸服。
    - 配丹參、朱砂等逐痰、鎮心、安神。
- **消腫散結**
  - 用於癰腫瘡毒，以甘遂末水調外敷，有消腫散結作用。
  - 亦可同時配合蒲公英、紫地丁等清熱解毒藥內服。

【使用注意】虛弱者及孕婦忌用。
《本草經集注》："惡遠志、反甘草。

【本草備要】

- 性味：苦寒有毒
- 功能
  - 能瀉腎經，及隧道水濕，直達水氣所結之處。以攻決為用，為下水之聖藥。
- 主治
  - 主十二種水，大腹腫滿，瘕疝積聚，留飲宿食，痰迷癲癇。
- 禁忌：虛者禁用

大戟《本經》

- 【來源】
  - 大戟科植物京大戟、茜草科植物紅芽大戟的乾燥根。
  - 大戟用根皮，其莖中空，其性為著表。
- 【性味與歸經】苦、辛，寒；有毒。歸肺、腎、大腸經。（脾）
- 【功效】 峻瀉、利尿藥。 瀉水逐飲，消腫散結。逐水通便，消腫散結，解毒。用於：
  1. 肝硬化腹水。
  2. 結核性滲出性胸膜炎。
  3. 各種瘡瘍腫毒、紅腫熱病。

紅芽大戟

【應用 I】

- **瀉水逐飲**
  - 用於身面浮腫、大腹水腫及胸脇積液等證。其逐水作用與甘遂相似而力稍遜。
    - 治水腫，用大戟與大棗同煮，食棗。
      - 十棗湯、舟車丸，均以大戟與甘遂、芫花等逐水藥同用，遂水力更峻。

【應用 II】

- 消腫散結
  - 用於熱毒癰腫瘡毒及痰火凝聚的瘰癧痰核。本品能消腫散結。內服外敷均可，如紫金錠中即用紅芽大戟。
    - 可與甘遂、白芥子為丸內服。
    - 亦可與天南星、朴硝等熬膏外用。

傳統所用大戟，主要 京大戟。而茜草科紅芽大戟，目前大戟藥材中使用最廣的一種。這兩個品種均有逐水作用，但**京大戟的逐水作用較紅大戟強**，而**消腫解毒多用紅大戟**。

【本草備要】

- 性味：苦寒有毒
- 功能：能瀉臟腑水濕，行血發汗，利大小便。
- 主治：治十二水，腹滿急痛，積聚癥瘕。頸腋癰腫，風毒腳腫，通經墮胎。
- 禁忌：誤服損真氣

芫花《本經》

- 【來源】　瑞香科植物芫花 Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 的乾燥花蕾。本品花先葉開放，...。
  - 其物先花後葉，是其性為著上... . 主治為咳逆上氣，喉鳴喘咽腫短氣，更不可知其為飲橫於上
- 【性味與歸經】辛、苦，溫；有毒。歸肺、腎、大腸經。
- 【功效】瀉下、利尿藥。瀉水逐飲，祛痰止咳，外用殺蟲療瘡，引產。功同甘遂。

芫花

芫花

芫花



【應用 I】

- 瀉下逐飲
  - 用於身面浮腫、大腹水腫、胸脅積液等證。芫花瀉水逐飲與甘遂、大戟相似而以**瀉胸脅水飲見長**，並能祛痰止咳。
    - 以芫花與大棗同煮，食棗治卒得咳嗽。現代用以治療慢性氣管炎屬於寒濕型者。

【應用 II】

- 殺蟲療瘡
  - 用於頭瘡、白禿、頑癬。芫花外用有殺蟲療瘡之功。同單用研末，或與雄黃共研細末，豬脂調膏外塗。

【使用注意】虛弱者及孕婦忌用。反甘草。

【本草備要】

- 性味：苦寒有毒
- 功能：去水飲痰澼
- 主治：療五水在五臟，皮膚脹滿，喘急，痛引胸脅，欬嗽瘴瘧。

巴豆《本經》

- 【來源】
  - 大戟科植物巴豆 Croton tiglium L. 的乾燥成熟種子。
- 【性味與歸經】
  - 辛，熱；有大毒。歸胃、大腸、肺經。

巴豆

- 【功效】瀉下逐水藥。瀉下逐水，外用蝕瘡。瀉下冷積，逐水退腫，祛痰利咽。逐水攻堅，蝕瘡殺蟲。用於：
  1. 寒積便秘，水腫腹脹。
  2. 小兒痰壅咽喉、氣急喘促。
  3. 肺壅、咳嗽胸痛、痰多腥臭。
  4. 痰迷心竅、癲癇痴狂。
  5. 瘡瘍化膿而未潰破者。

【應用 I】

- 寒積便秘
  - 用於寒邪食積，阻結腸道，突然腹滿脹痛，大便不通，甚至氣急暴厥者。
    - 巴豆辛熱，能峻下寒積，開通閉塞，前人喻其有 "斬關奪門之功"。寒邪食積，病情急劇，氣血未衰者，每用為主藥，配乾薑、大黃為丸服，即三物備急丸。

【應用 II】

- 逐水退腫
  - 用於大腹水腫。是取其強烈瀉下作用以消腹水
    - 如《補缺肘後方》治水蠱腹滿，用巴豆、杏仁炙黃為丸服。近代用本品配絳礬，名含巴絳礬丸，治療晚期血吸蟲病肝硬化腹水。

【應用III】

- 祛痰利咽
  - 用於喉痹，痰涎壅塞氣道，呼吸急促，甚至窒息欲死者。巴豆能祛除痰涎以利呼吸。
    - 用巴豆霜吹入喉部，引起嘔吐，排出痰涎，或伴有腹瀉，使梗阻症狀得以解除。
- 外用蝕瘡

【使用注意】

- 服巴豆時，不宜食熱粥、飲開水等熱物，以免加劇瀉下。
- 服巴豆後如瀉下不止者
  - 用黃連、黃柏煎湯冷服，或食冷粥以緩解。
- 無寒實積滯、體弱者及孕婦忌用，畏牽牛。
- 本品最易劫液傷陰，內服宜謹慎，只可暫用，中病即止。

- 《本草經集注》：惡蘘草。畏大黃、黃連、藜蘆。
- 《藥對》：畏蘆筍、菰筍、醬、豉、冷水。

【本草備要】

- 性味：辛熱有大毒。
- 功能
  - 或薰鼻，或刺喉，能行惡涎惡血。
- 主治
  - 治中風中惡，痰厥氣厥，喉痹不通，一切急病。

牽牛子《別錄》

- 【來源】　　旋花科植物牽牛 Ipomoea hederacea Jacq. 或毛牽牛 Ipomoea purpurea (L.) Lam. 的乾燥成熟種子。　　為旋花科植物裂葉牽牛 Pharbitis nil （L.） Choisy 或圓葉牽牛 Pharbitis Purpurea （L.） Voigt 的乾燥成熟種子。本品始出田野，人牽牛謝藥，藥用其子，故名。
- 【別名】黑丑、白丑。
- 【性味與歸經】
  - 苦，寒；有毒。微辛。歸肺、腎、大腸經。

牽牛子（黑丑，白丑）(三稜,背面弓狀隆起,灰黑黃白,稜上種臍,硬斷面顯油)

- 【功效】瀉下、利尿、殺蟲藥。 **<u>瀉下逐水</u>**，<u>去積</u>，<u>殺蟲</u>。 瀉水利尿，逐痰殺蟲。用於：
  - 肝硬化腹水。
  - 腎臟水腫、二便不利、腳氣。
  - 蟲積。
  - 痰壅氣滯、咳逆喘滿。
  - 便秘。

【應用 I】

- **瀉下逐水**
  - 用於水飲停蓄，水腫腹脹。
    - 牽牛子既能瀉水，又能利尿，使水濕從**二便**排除。其逐水力雖較甘遂、大戟、芫花稍緩，但仍 峻下之品，以水飲停蓄正氣未衰者為宜。
    - 可單用，或入複方應用。如《千金方》治水腫，即單用牽牛子研末服之，以小便利為度。禹功散治停飲腫滿，以本品與茴香共為末，薑汁送服。
    - 可用於痰飲喘咳，多與葶藶子、杏仁、厚朴同用。

【應用 II】

- 去積
  - 用於腸胃濕熱積滯，大便秘結。本品少用能通大便，去積滯。
    - 少則動大便，多則下水　之說。
    - 本品為末，薑汁送服，治大便不通
      - 配桃仁，研末蜜丸服，治大腸風秘結澀。

【應用III】

- 殺蟲
  - 用於蟲積腹痛。牽牛子能驅殺蛔蟲，並可藉瀉下作用排除蟲體。
    - 牛榔丸，即以本品與檳榔同用，驅蟲效果更好，可治療蛔蟲、絛蟲等多種寄生蟲病。

【使用注意】　脾胃氣虛者及孕婦忌服。不宜與巴豆同用。若服量過大，可引起嘔吐、腹瀉、腹痛，血便，血尿，重者使舌運動痲痺而語言障礙，甚至昏迷。《本草衍義補遺》：“若非病形與脈症俱實者勿用也。稍涉虛，以其驅逐之致虛，先哲深戒之。不脹滿，不大便秘者勿用。

商陸《本經》

- 【來源】　本品係商陸科植物商陸 Phytolacca esculenta Van Hout. 的根。
- 【性味與歸經】苦，寒；有毒。歸肺、腎、大腸經。入脾、膀胱經。
- 【功效】利尿峻瀉逐水、消炎消腫藥。逐水消腫，解毒散結，通利二便。瀉下利水，消腫散結。用於：

1. 腎臟性水腫脹滿，二便不通、腹水。
2. 癰瘡腫毒，惡瘡。
3. 喉痹不通。





商陸片{羅盤紋=同心環紋}

商陸片(外皮灰棕,邊緣皺縮,木部凸起同心環)

【應用Ⅰ】

- 瀉下逐水
  - 用於水腫脹滿，大便秘結、小便不利者。商陸能通利大小便，使水濕從二便下泄，以消除腫滿。
    - 本品與澤瀉、赤小豆、茯苓皮、檳榔等利水行氣藥同用，其消腫作用尤著。
    - 李時珍云：以赤根(赤商陸)搗爛，入麝香三分，貼子臍上，以帛束之，得小便利則腫消。這是用商陸外治消水腫的方法。

【應用 II】

- 消腫散結
  - 用於癰腫。商陸外用能消腫散結。治癰腫可用鮮根酌加食鹽，搗爛外敷，乾即換藥。
    - 配苦參：清熱消腫。用於癰腫熱結，煩熱脹痛。

【使用注意】脾虛水腫及孕婦忌用。

【本草備要】

- 性味：苦寒有毒
- 功能：沉陰下行，與大戟甘遂同功。瀉蠱毒，傅惡瘡，墮胎孕，令人見鬼神。
- 主治：療水腫滿脹，瘕疝癰腫，喉痺不通，濕熱之病。

千金子《開寶本草》

- 【來源】 大戟科植物續隨子 Euphorbia lathyris L. 的乾燥成熟種子。
- 【 別名】小巴豆、續隨子。
- 【性味與歸經】辛，溫；有毒。歸肝、腎、大腸經。
- 【功效】 利尿峻瀉藥。逐水退腫，破血消癥。 用於：

1. 肝硬化腹水和晚期血吸蟲病腹水。
2. 小便不通。
3. 經閉癥瘕積聚。
4. 外治疥癬瘡毒，毒蛇咬傷。



千金子(橢圓,灰棕,網皺紋,基部偏向斜切面,種皮薄硬脆,內仁黃白油性)

【應用Ⅰ】

- 逐水退腫
  - 用於水腫腹滿，二便不利。千金子瀉下逐水作用甚為峻烈，且能利尿，宜於二便不利之水腫實證。
    - 單用有效，如《斗門方》治水氣腫脹，即單用本品壓去油服。
    - 又《摘玄方》治**陽水腫脹**，以本品壓去油，配大黃末，酒水為丸服。

【應用 II】

- 破血消癥
  - 用於瘀滯癥瘕、經閉。
    - 本品能破瘀血，消癥瘕，通月經。如《聖濟總錄》續隨子丸，以本品配輕粉、青黛為末，糯米飯黏合為丸，治癥塊。
    - 治瘀血經閉，可與其他活血調經藥，如當歸、川芎、紅花同用。

【使用注意】體虛者及孕婦忌用。外用適量。
中氣不足，大便溏洩忌服。

【本草備要】

- 性味：辛溫有毒。
- 功能：
  - 行水破血。
  - 利大小腸，下惡滯物，塗疥癬瘡。
- 主治：
  - 治癥瘕痰飲，冷氣脹滿，蠱毒鬼疰。

I will be back ！！